

ПРИБАВЛЕНИЕ

КЪ НИЖЕГОРОДСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ

ВЪДОМОСТЯМЪ:

№ 50.

ИЗВѢСТІЯ.

1. Бѣдственное средство противъ простуднаго кашля.

При первомъ появленіи простуднаго кашля, взявъ: *маковыхъ цвѣтовъ* пол-зоскопика, или *маковыхъ головокъ* десятишь граней, наливъ стаканомъ кипятку, и насыпавъ въ закрытомъ сосудѣ, въ продолженіе десятихъ минутъ; послѣ того, жидкость слить, прибавить къ ней для вкуса нѣсколько сахара, и выпивать это количество настоя каждое утро и вечеръ, до совершеннаго прекращенія кашля. Но если кашель не исчезъ уже въ хроническое состояніе, то къ маковымъ цвѣтамъ можно прибавить десятишь граней *цвѣтовъ бараньей травы*.

2. Вегетіе цынготной болѣзни внутренимиъ и наружными употребленіемъ пивныхъ дрожжей.

Особенно рекомендованное средство д-мъ Нейманомъ въ Берлинѣ, испытано д-омъ Финкъ съ отличнымъ успѣхомъ. Онъ приводитъ слѣдующій случай: у одной женщины, отъ роду 35 лѣтъ, крѣпкаго стѣтосложенія, страдавшей нѣсколько разъ чесоткою и другими болѣзнями, по причинѣ распутой ея жизни, оказались въ Ноябрь мѣсяцъ 1838 года, признаки цынготной болѣзни, скоро достигшіе высокой степени: печальное расположеніе духа, блѣдность и опухлость лица, усталость и слабость оцѣлъ, боли въ груди и животѣ, также боли въ конечностяхъ, провинціи, по выра-

женію больной, до самыхъ костей, затруднительное дыханіе, дурной запахъ изо рта, опухлость и темносиній цвѣтъ десенъ, выпаденіе зубовъ, багровыя пятна на разныхъ мѣстахъ шѣла а особенно на нижнихъ конечностяхъ, опухоль ногъ. Сильнѣйшія прошивудынготинныя средства, приличная діета и помѣщеніе больной въ женской больницѣ, осматывались безъ успѣха. Фивкъ назначалъ больной пивныя дрожжи сваружі въ видѣ примочекъ и вовури каждыя 2 часа по 2 столовыхъ ложки. По истеченіи сутокъ, дальнѣйшее развитіе болѣзни остановилось, а по прошествіи трехъ недѣль, больная, обреченная уже на смерть, совершенно выздоровѣла. По мнѣнію Фивкъ пивныя дрожжи составляютъ настоящее специфическое средство противъ цыганотной болѣзни.

(Изъ Таоригескихъ Губ. Вѣд.)

3. Извѣрныя средства отъ мокротнаго кашля.

1. Взять 40 капель сырой воды, влить въ оную 40 капель рому и на попить тудаже 40 капель жженого ра сѣнчатъ сахару и проглотить все это. выпить ложась спать; въ случаѣ надобности можно повторять пріемъ сей, а для взрослыхъ на одинъ пріемъ порцію эту можно удвоить. Не было прѣмѣра, чтобы послѣ одного или двухъ пріемовъ продолжался кашель.

2. Взять прованскаго или деревяннаго масла одну не большую рюмку, всыпавъ туда двѣ чайныя ложки мелко источенаго сахару и смѣшавши какъ можно лучше, выпить вечеромъ ложась спать, а попомѣть записать часомъ или горячимъ настоемъ изъ бузиновыхъ цвѣтцовъ (Flores Sambuci). — На утро кашель совершенно уничтожился.

(Изъ Воронеж. Губ. Вѣд.)

4. О прѣкавшихъ и выкашавшихъ (сб 29 Нолбра по 6 число Декабря 1844 года.)

Прибыли: изъ Коярова—ошстав. Шатскій Совѣтникъ Бороздинъ, изъ С. Пешербурга—Коллежскій Совѣтникъ Нащокинъ, изъ Плеса—Подполковникъ Лютеръ, изъ Макарьева—ошс. Подпоручикъ Львовъ, изъ Василь—ошс. Коллежскій Регистраторъ—Мельгуновъ, остановились Кремлевской части; изъ Оренбурга—Подпоручикъ Брудинскій, изъ Галича—Подпоручикъ Смуратовъ, остановились Рождественской части; изъ Москвы—Карнестъ Русеневъ, остановился Макарьевской части.

Выѣхали: въ Я. оглавъ Генералъ-Маіоръ Князь Голицынъ, въ Печники—Шатскій Совѣтникъ Бороздинъ, въ С. Пешербургъ—Подполковникъ Германъ, въ Москву—Тишуйарный Совѣтникъ Саранцевъ и Подпоручикъ Брудинскій, въ Василь—Карнестъ Русеневъ.